

PRZYPADEK KLINICZNY

Redukcja przestrzeni międzyzębowych w terapii alignerami.



Dr. Tommaso
Weinstein,
DDS, PhD

Zarządzanie przestrzeniami interproksymalnymi jest bardzo ważnym zagadnieniem w terapii z zastosowaniem przezroczystych alignerów. Ten przypadek prezentuje stłoczenie w górnym i dolnym łuku zębowym.

Pacjent został wyleczony za pomocą leczenia alignerami. Redukcja interproksymalna (IPR) została dokładnie zaplanowana. FitStrip™ pozwolił na wykonanie IPR z przewidywalnością i kontrolą, przy użyciu pasków różnych grubości. Pacjent zgłaszał doskonały komfort podczas zabiegu, lepszy niż w przypadku zwykłych pasków.

Garrison
Dental Solutions

150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI USA
49456



contactme@garrisondental.com
www.garrisondental.com/pl



Rys 1, 2 i 3. Sytuacja początkowa, górny i dolny łuk zębowy. Zdjęcia wewnętrzne.



Rys 4-7. Cyfrowa kontrola przed (4 i 5) i po (6 i 7). Numery odnoszą się do redukcji IPR.



Rys 8. FitStrip użyty do IPR.



Rys 9. Założone alignery.



Rys 10 and 11. Kompozyt zastosowany na brzegach siecznych.



Rys 12 i 13. Efekt końcowy w łuku górnym i dolnym.